

- * 隨時保持傷口乾燥及乾淨，若傷口已用美容膠貼住，第二天可擦澡，未拆線前勿淋浴只要保持乾燥即可，滿一週後可拆線。
- * 未拆線前雙手勿做劇烈運動。
- * 術後1~2天，若無特殊情況，醫師會准予出院門診追蹤。
- * 術後若有以下徵象需返院就醫：
 1. 傷口化膿。
 2. 高燒、畏寒、或嘔吐。
 3. 呼吸急促不適。



地址：高雄縣824燕巢鄉角宿村義大路1號

電話：07-6150011

網址：edah@edah.org.tw

本著作權非經著作權人同意不得轉載翻印或轉售
 著作權人：財團法人義大醫院
 表單編號：HA0021

多汗症



 **財團法人義大醫院** 編印
 E-DA HOSPITAL / I-SHOU UNIVERSITY

多汗症

一、定義：

人是恆溫的動物，需保持一定的體溫，交感神經會參與體溫之調節。多汗症是指排汗異常增加之現象，會造成生活上的諸多困擾。

二、原因：分為原發性及繼發性兩種。

1. 原發性多汗：

佔大多數，其原因主要是因為交感神經反射的亢進而引起過多排汗。有強烈的遺傳傾向，半數病人有家族史，一般人在國小時出現症狀，隨著年齡增長，症狀會愈嚴重，在青少年時期達到

最高峰，出汗部位以手心最常見，其次是腳底和腋下這些汗腺分佈較多的地方。



2. 繼發性多汗：

包括身體系統性疾病，如：糖尿病、低血糖、甲狀腺疾病等；中樞神經系統疾病，如：腦下垂體或下視丘的病變，有時也會引起多汗情形。

三、治療方法——胸腔鏡交感神經切除術：

在全身麻醉和指溫測定器的監視下，藉著胸腔鏡，經由肋間近腋下之部位插入胸腔，以雷射或特殊電燒除第2胸椎神經節。

四、術後出院衛教及傷口的照顧事項：

- * 雙手掌會呈現發紅或乾熱感覺是正常、暫時的現象，可塗抹乳霜，慢慢會改善。
- * 依醫囑服用止痛劑，以減輕傷口疼痛。
- * 身體其他部位如：軀體，可能因代償關係而較易出汗，必要時隨時更換乾爽衣物。
- * 術後偶會胸悶、呼吸困難，可採坐姿及做深呼吸，必要時醫護人員將予氧氣及安排胸部X光檢查。

