

\_\_\_點\_\_\_分至泌尿科\_\_\_\_\_醫生門診複診。  
□看診時，請攜帶本人身分證證件及健保IC卡  
至櫃檯掛號。

有任何疑問請洽：義大醫院衛教室電話：

07-6150011轉5858 祝您健康愉快！

義大醫院

## 生殖器手術後注意事項



本著作權非經著作權人同意不得轉載翻印或轉售

著作權人：義大醫療財團法人

表單編號：HA-1-0041(1)

義大醫療財團法人 20X20cm 2015.10印製 2011.05修訂

 義大醫療財團法人 E-DA HEALTHCARE GROUP 編印

# 生殖器手術後注意事項

先生

## 一、包莖環切術注意事項：

- 手術後傷口部分應保持清潔乾燥，小便時請小心不要弄濕紗布，如果紗布被尿液浸濕，可先將紗布拿掉，再回門診換藥。
- 手術後陰莖會腫脹，傷口會有滲液結痂等現象，這些都是手術後會有情形，請不必驚慌，約3天後症狀即可消退。
- 包皮環切除手術皆用自然吸收縫線，不需拆線任其自然脫落即可。
- 請勿自行清理結痂，否則易造成出血情形，應任其自行脫落。
- 術後活動不必限制，盡量穿寬鬆褲子，以免摩擦造成疼痛。
- 施行包皮環切術者，4星期内請暫停性生活，盡量不要有勃起狀況。
- 返家後如出現傷口出血不止、傷口裂開、膚色有異常或持續發燒38°C度以上，請立即返院接受進一步檢查治療。

## 二、輸精管結紮注意事項：

- 手術後傷口部分應保持清潔乾燥，兩天後可以淋浴，並可自行使用藥膏護理傷口。

### 傷口處理方法：

- 每天1-2次，請先以無菌棉棒沾生理食鹽水

擦掉傷口分泌物，由傷口中央往外環形擦拭，不可來回擦拭，擦拭乾淨後再塗上1-2mm 薄薄的藥膏，並拿取覆蓋傷口的無菌紗布固定，切勿碰觸到紗布中央，以免造成傷口感染。

縫線在10-14天會自行脫落，不需拆線術後可以照常工作及行房，大約射精12-20次後才沒有精蟲，所以術後3個月仍然要避孕(因結紮之前已有精子儲存於精囊裡)，再回門診做精液分析確定精液內有否精蟲才有避孕效果。

睾丸在術後可能會有暫時性的腫脹一段時間後無法排出的精蟲會被重新吸收分解成養分，腫痛感也會消失。

傷口痊癒後可有性生活

若傷口術後傷口會有些微鮮血流出，如在紗布上呈現五元或十元硬幣大小，乃正常現象。如果有持續滲血之情形或整塊紗布都滲血，請加壓止血5-10分鐘，如未改善或傷口出現紅、腫、熱、痛或體溫超過38度時，請儘速回診。

## 三、回診注意事項：

看診時，請持門診預約單和健保IC卡，於  
\_\_\_\_月\_\_\_\_日、星期\_\_\_\_