

#### 五、出院後注意事項：

1. 定期回診檢查。
2. 手術傷口處應保持乾淨，避免抓傷，預防感染。
3. 一般日常生活沒限制，但避免頭部的碰撞意外。
4. 若有下列情形發生，如：嘔吐、腹瀉、發燒、不安、頭痛、抽搐、呼吸異常及分流管經過之處異常紅腫、熱痛時，請儘速找醫師。



地址：高雄市824燕巢區角宿里義大路1號  
電話：07-6150011  
網址：edah@edah.org.tw

## 腦室腹腔分流術



本著作權非經著作權人同意不得轉載翻印或轉售

著作權人：義大醫療財團法人

表單編號：HA-1-0100(1)

義大醫療財團法人 20X29.7cm 2016.01印製 2012.11修訂

 義大醫療財團法人 編印  
E-DA HEALTHCARE GROUP

# 腦室腹腔分流術

## 一、什麼是水腦？

顱內的循環系統一旦受阻，無論它的原因是先天的或後天的，都將因腦脊髓液的積留及過多而形成「水腦」。

## 二、何謂腦室、腹腔分流術？

將一條非常柔軟的分流管的一端接在腦室內，另一端則接入腹腔，使過多的腦脊髓液安全的流入腹腔，而加以回收。



## 三、手術前的準備事項：

1. 填寫手術同意書。
2. 於前一天剃頭，並將頭洗乾淨。
3. 前一天洗澡，保持皮膚的清潔及乾燥。
4. 手術前6～8小時禁食，包括：水、食物、藥等都不能服用，以免食物於手術中嘔吐而造成吸入性肺炎，造成危險。

### \*部分管子有球狀裝置，其作用有：

1. 調節並疏導腦脊髓液的流速。
2. 監視分流管是否通暢。
3. 做特殊的檢查。
4. 必要時由醫師抽取腦脊髓液或做沖洗等治療用。

## 四、手術後注意事項：

1. 如手術後情況穩定，護理人員會告訴您何時進食，進食前先給病人喝點開水，如果沒有嘔吐，就可進食流質或其他食物。
2. 請注意，需使病人躺向未開刀的一側，或平躺，以免壓到傷口。
3. 在正常情況下手術後第三天醫師會來換藥

- ，手術後的傷口：頭部、頸部及腰部等處，需保持乾燥，以避免感染。
4. 鼓勵患者做深呼吸和有效的咳嗽，如此可以預防肺炎的發生，家屬可以手呈杯狀來拍打病患背部兩側肩胛骨。每隔1～2小時就給病患翻身，以免局部皮膚受壓太久而造成不舒服或形成褥瘡。
5. 術後第一、二天，為避免腦脊髓液過度流下，宜避免激烈的姿勢改變。

