



地址：高雄市824燕巢區角宿里義大路1號  
 電話：07-6150011  
 網址：edah@edah.org.tw

## 什麼是冠狀動脈 繞道手術



本著作權非經著作權人同意不得轉載翻印或轉售

著作權人：義大醫療財團法人

表單編號：HA-1-0138(1)

義大醫療財團法人 20X20cm 2016.05印製 2011.05修訂


 義大醫療財團法人 編印  
 E-DA HEALTHCARE GROUP

## 什麼是冠狀動脈 繞道手術

冠狀動脈繞道手術是經由外科手術的方法，來改善發生阻塞的冠狀動脈血流灌注，可以減輕您心絞痛症狀及改善生活品質，其目的並非治癒冠狀動脈疾病，因此手術後仍需加強控制疾病的危險因子。

冠狀動脈繞道手術可經由身體多個部位取得繞道移植體，最常見的是由您腿部截取一段隱靜脈，一端置於冠狀動脈阻塞的遠端區，另一端接於升主動脈；另一方法則是將您的內乳動脈由胸壁剝離出，並將其遠端接於冠狀動脈阻塞部位下方。罹患多條冠狀動脈疾病之患者可由同一手術中進行多條血管的繞道術。

冠狀動脈繞道手術亦被認為是維持冠狀動脈長久暢通最好的方法。



接受冠狀動脈繞道手術後的門診治療及追蹤

冠狀動脈繞道手術只是治療冠狀動脈疾病的一個環節：造成動脈硬化的基本疾病，並未因手術而消除，故術後病人終生需針對減緩或消除動脈硬化作治療，否則接上的繞道血管及本身的冠狀動脈仍會持續進行血管硬化而再發生心肌缺血。故戒煙，控制體重，適當運動，注意飲食成分，治療高血壓，高血脂，糖尿病等基本原則仍須繼續遵行。

出院後傷口的處理：當確定傷口癒合並且拆線後，您可以將傷口上的敷料拿掉，並可於三天後淋浴，只要在淋浴後保持傷口乾燥即可。如您期望傷口長的美麗，可自行購買透氣紙膠帶，每二~三天換貼一次，一直持續半年，若您對膠帶有過敏反應，如皮膚發紅、起水泡，就必須停止使用，以免造成不適及感染。

必須注意的異常現象：

1. 呼吸急促，不暢
  2. 眼臉、手指、腳踝腫脹
  3. 體溫超過攝氏38°C，持續二十四小時以上
  4. 小傷口周圍紅腫，且有壓痛現象或有多量的液體排出
  5. 不明原因的上腹部脹痛伴隨噁心及嘔吐
  6. 排尿量劇減
  7. 心跳、脈搏突然減慢、增快或不規律
- 若有上述情況則須迅速返院就診。