

認識透析藥水的居家管理

一、建議透析液儲存環境

- (一) 透析液的儲存應放於室溫，乾淨，陰涼處的地方，應避免陽光曝曬或潮濕的環境，避免放在窗戶下。
- (二) 不同品項的透析液應該分開歸類放置。
- (三) 紙箱堆疊高度不超過 5 箱，以方便拿取。
- (四) 透析液應集中放置，有效日期較近的擺放在前面或上面，可以優先使用。
- (五) 透析液勿隨意擺放，應放在原包裝的紙箱內，空的紙箱應立即丟棄。
- (六) 紙箱勿直接放置在地板上，應該使用塑膠板或軟墊隔開約 2 公分。

二、透析液相關注意事項

- (一) 胺基酸藥水的儲存要避光，絕對要避免陽光直射，開封後未使用完的藥水，需放在紙箱內，並將紙箱封口蓋好。
- (二) 攜帶透析液外出時，不建議放在後車廂內，以免溫度太高。
- (三) 簽收到貨品後，需與司機核對下列事項：
 1. 透析液的種類，濃度及容量是否正確。
 2. 透析液及配件的數量是否正確。
 3. 透析液及配件的有效期限是否過期或破損。

聯絡資訊	
義大醫院 地址:高雄市燕巢區角宿里義大路1號 電話:07-6150952	義大大昌醫院 地址:高雄市三民區大昌一路305號 電話:07-6150208