

內視鏡靜脈瘤結紮術注意事項

一、名詞解釋

靜脈瘤因血管內壓力過高，很容易破裂造成大出血，為了治療或預防其破裂出血，可經由胃鏡，將靜脈瘤以特殊的橡皮圈套住，被綁住的靜脈瘤因血流被阻斷而萎縮，以達到治療目的。

二、適用對象

肝硬化患者、肝炎患者、酗酒的人、門靜脈高壓的患者

三、照護及注意事項

- 檢查後需再禁食4小時(包括水、藥物、香煙)
- 檢查後需再禁食1小時(包括水、藥物、香煙)
- 檢查後依醫師指示持續禁食(包括水、藥物、香煙)

內視鏡靜脈瘤結紮術注意事項

2. 可進食時：

- (1) 前1~3天需進食流質飲食，如：果之、米漿、豆漿、牛奶、米湯。
- (2) 第4~7天再進食軟質飲食，如：稀飯、麵條。
- (3) 一週後可正常飲食。

3. 返家後如有出血徵象，例如：咖啡色嘔吐物、解黑血便等，請於上班時間：星期一~五 8:00~17:00 電話聯絡，下班後請至急診就醫。

義大醫療財團法人 胃腸肝膽科 關心您的健康

聯絡資訊

義大醫院 地址：高雄市燕巢區 角宿里義大路 1 號 電話：07-6150011 轉5179	義大癌治療醫院 地址：高雄市燕巢區 角宿里義大路 21號 電話：07-6150022 轉6711	義大大昌醫院 地址：高雄市三民區 大昌一路305號 電話：07-5599123 轉7541
--	---	--