

## 24 小時尿液(加酸)採檢衛教單

### ※檢驗項目：

VMA、5-HIAA、24 hr urine-catecholamines

### ※收集前注意事項：

1. 採檢前 3 天禁食巧克力、咖啡、香蕉、柑橘類水果、Aspirin 及抗血壓藥以免引起假性增高(治療中之高血壓患者仍應遵照醫師指示按時服用藥物)。
2. 女性月經期間請勿採檢。
3. 6N HCl 鹽酸具有危險性，請小心操作，若不慎發生皮膚或眼睛接觸時，請以大量清水沖洗 20~30 分鐘並立即送醫。若不慎誤食時，切勿催吐，若意識清楚時，先以清水徹底漱口，喝 240~300 c.c. 的水，若有牛奶，喝水後再喝牛奶；若意識不清楚時，勿餵食任何東西，請立即送醫。

### ※24 小時尿液收集步驟：

1. 開始收集時排掉第一泡尿液不收集。(如欲早上 8 點開始收集，於 8 點時需排掉膀胱內尿液)
2. 將第二泡尿液收集至集尿桶後加入第 1 管 6N HCl 鹽酸，持續收集尿液直到第二天的相同時間排出最後一次尿液並收集，即為 24 小時尿液。
3. 收集期間須將集尿桶放冰箱冷藏保存。
4. 紀錄 24 小時總尿量於第 1 管圓底尿管上，將集尿桶尿液混合均勻，吸取 10 c.c.於第 1 管圓底尿管。繳交第 1 管圓底尿管。
5. 若 24 小時未到，集尿桶已滿，請先紀錄第 1 次集尿桶總尿量，吸取 10c.c.尿液於第 1 管圓底尿管。倒乾集尿桶後繼續收集尿液，並加入第 2 管 6N HCl 鹽酸，持續收集尿液直到 24 小時結束。紀錄第 2 次集尿桶總尿量，並加總第 1 次集尿桶總尿量，即為 24 小時總尿量，登記總尿量於第 2 管圓底尿管上。將第 2 次集尿桶尿液混合均勻，吸取 10 c.c.於第 2 管圓底尿管。繳交第 1 管與第 2 管圓底尿管。

### ※檢體繳交注意事項：

1. 將裝有尿液的圓底尿管以冷藏方式(傳送袋內放冰塊)繳交至收件窗口，並**與收檢人員確認 24 小時總尿量**。
2. 各院區收檢時間如下：

	週一~週五	週六	連絡電話
義大醫院	08:00~21:30	08:00~12:00	07-6150011 轉 2803
義大癌治療醫院	07:00~16:00	07:00~12:00	07-6150022 轉 6285
義大大昌醫院	08:00~21:00	08:00~12:00	07-5599123 轉 7216

義大醫療財團法人 關心您!