

玻璃體內注射護理指導照護衛教單

壹、玻璃體內注射定義

將藥物注入眼球玻璃體內，達到抑制眼球新生血管增生及黃斑部病變，或治療眼內炎的治療方法。

貳、適用對象

糖尿病黃斑部水腫病變、視網膜病變病人

參、注射前注意事項

- 一、經醫師評估眼睛病變程度、解釋說明注射方式、療效及費用。
- 二、需填寫手術同意書及自費同意書。
- 三、眼球玻璃體注射，採用眼睛的局部麻醉(點局部麻醉藥水)。
- 四、當日可正常飲食及服用常規口服藥。
- 五、當日交通工具最好是搭車，禁止自行騎車或開車，建議有家人陪同。
- 六、依約定時間至門診5樓眼科手術室報到。

肆、照護方式

- 一、手術注射後患眼會覆蓋紗布，注意安全，預防跌倒。
- 二、當日患眼紗布請於四小時後自行取下，依醫師處方按時點藥。
- 三、手術注射後二至三天內眼睛不碰水及揉眼睛，避免感染。

伍、注射後注意事項

- 一、注射後可能會出現看見漂浮的黑點或線狀物、暫時性視力模糊、注射部位疼痛的現象，這些現象在術後數天會逐漸改善。
- 二、注射後若有嚴重之眼睛紅腫、疼痛、視力模糊、視野缺損、畏光、流淚或任何不適症狀，請立即返院檢查。
- 三、注射後請依約定時間回診複檢。

有任何疑問請洽:義大醫院眼科

聯絡資訊

義大醫院

地址:高雄市燕巢區角宿里義大路1號 電話:07-6150011 分機5888